

TÁJÉKOZTATÓ CT VIZSGÁLATRÓL

- Betegek és hozzátartozóik részére -

TISZTELT BETEGÜNK, ÜDVÖZÖLJÜK INTÉZETÜNKBEN!

Önt kezelőorvosa a velünk történt megbeszélés alapján CT vizsgálatra utalta hozzánk. Ez olyan speciális eljárás, ahol röntgen sugárzás alkalmazásával keresztmetszeti képeket kapunk a testről. Ezáltal információt nyerhetünk a vizsgált szervekről, jelentősen segítve ezzel az Ön kezelőorvosát betegsége megállapításában és kezelése megtervezésében.

Az Intézetünk nagy betegforgalma miatt elképzelhető, hogy Önnek várakoznia kell. A betegeket előjegyzés alapján, de nem feltétlenül érkezési sorrendben vizsgáljuk, mivel a sürgősségi esetek, súlyos állapotú betegek soronkívüliséget élveznek.

FONTOS TUDNIVALÓK CT VIZSGÁLAT ELŐTT!



Terhesség: Kérjük, jelezze ha terhes, vagy nem kizárt a terhesség lehetősége! (A terhesség alatt, különösen a terhesség első harmadában az ionizáló sugár károsíthatja a magzatot.)

Fogamzó korban lévő nőknél a menstruáció kezdő napjától számított 10 napon belül lehet csak rtg. sugárzást alkalmazni!

Cukorbetegség: Amennyiben a **metformin** tartalmú készítmény valamelyikét szedi, pl.: **Adimet, Gluformin, Meforal, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metrivin**; kombinált készítmény: **Avandamet**, tilos vénás kontrasztanyagot beadni, kivéve, ha a gyógyszer szedését a vizsgálat előtt 48 órával felfüggesztette! Amennyiben a fenti gyógyszerek valamelyikét rendszeresen szedi, kérjük, jelezze ezt az Önt vizsgáló radiográfusnak.

Kontrasztanyag - gyógyszerérzékenység: Fontos tudatnia velünk, ha korábbi CT vizsgálat során kapott intravénás jódos kontrasztanyagot, és ha ezek közül bármelyik érzékenységi reakciót váltott ki Önnél. Jelezze, ha bármilyen gyógyszerre érzékeny, allergiás.

Vese - pajzsmirigy betegség: Kérjük, jelezze amennyiben ismert vesebeteg, vagy pajzsmirigykezelés alatt áll.

I. VIZSGÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

A vizsgálat előtt 4-6 órával már nem fogyaszthat ételt, csak vizet ihat, és az orvosával megbeszélte gyógyszereit veheti csak be.

Bizonyos vizsgálatoknál szükség lehet a kivehető fogpótlást, nyaklánc, fülbevaló eltávolítására. (Értéktárgyaiért nem vállalunk felelősséget!)

II. A VIZSGÁLAT MENETE

A betegségével összefüggő, előző vizsgálatának eredményeit, leleteit, képeit kérjük, adja át a betegfelvételnél az asszisztensnek, ezzel a diagnosztikai munkánkat segíti. Az átadott dokumentumok a vizsgálatot követően, fénymásolás után hiánytalanul visszakérülnek Önhöz.



A hasi és kismencedei vizsgálatokat megelőzően általában 1 liter kontrasztanyagot kell meginnia, 1-1,5 óra alatt.

Kérjük, mielőtt elkezdené inni a kontrasztanyagot, ürítse ki húgyhólyagját. Ez a kontrasztanyag ritkán enyhe hasmenést okozhat, egyéb mellékhatása nincs, de esetleges elhagyása jelentősen csökkentheti a vizsgálat értékét.

A CT vizsgálat időtartama hozzávetőleg 10-15 perc. A vizsgált régiótól és a feltételezett betegségtől függ a vizsgálat hossza és esetleges intravénás kontrasztanyag alkalmazása.

A vizsgálatra az Önt vizsgáló radiográfus név szerint szólítja. Kérjük, legyen bizalommal iránta, hiszen a vizsgálat során vele fog kapcsolatot tartani és ő fogja segíteni.

Lényeges, hogy a vizsgálat során a radiográfus által beállított pozícióból ne mozduljon el. A vizsgálat során a hangszóróból kapott utasításokat kérjük, pontosan tartsa be.

III. KONTRASZTANYAG ALKALMAZÁSA

Betegségének pontosabb megállapítása érdekében szükségessé válhat intravénás röntgen kontrasztanyag alkalmazása; így láthatóvá válik számos olyan elváltozás, amely a kontrasztanyag elhagyása esetén nem ábrázolódhat. A kontrasztanyag csekély veszéllyel jár, de kiválthat változó súlyosságú allergiás tüneteket.

Fontos tudnia, hogy a vizsgálat kockázata jelentősen kisebb, mint elhagyása esetén az idejében ki nem mutatott betegség!

A kontrasztanyag beadása közben átmeneti melegségérzés kialakulhat, enyhe tünetek lehetnek: pl. bőrkütiés, ingerköhögés, hányinger, hányás, bőrvizketés. Igen ritkán előfordulhatnak súlyosabb szövödmények, úgy, mint esetleges nehézlégzés, gége ödéma, ájulásérzés, keringési rendellenesség, eszméletvesztés, **melynek kezeléséhez és elhárításához rendelkezünk a szükséges szakértelemmel, gyógyszerekkel és műszerekkel!**

Esetenként előfordulhat, hogy a vénafal gyengesége miatt a beadott kontrasztanyag a véna melletti szövetekbe jut és ott az érből kikerült oldat mennyiségétől függően enyhe, vagy súlyosabb gyulladáisos reakció keletkezik.

Amennyiben a fent leírt tünetek bármelyikét észleli, kérjük, azonnal jelezze felénk!

IV. VIZSGÁLAT UTÁNI TEENDŐK

A vizsgálat befejezése után a branül a vénában marad, 10-15 percig, mely idő alatt az előkészítő helyiségben foglal helyet. Amennyiben ezen időszak alatt bármilyen panasza jelentkezne a fentebb felsoroltak közül, kérjük, azt azonnal jelezze! Amennyiben nincs panasza, a branül eltávolítását követően eltávozhat.

Tájékoztatást kap arról, hogy mi módon kapja meg Ön, vagy az Ön kezelőorvosa a vizsgálati eredményt és leleteket. A vizsgálat eredményét Ön, vagy törvényes képviselője veheti át.

Ettől eltérő esetben meghatalmazást szükséges kitölteni, melynek átvétele után tudjuk kiadni a vizsgálati eredményt.

Kérjük, hogy a leletét saját érdekében őrizze meg, és egy esetleges újabb vizsgálatnál hozza magával.

Köszönjük, hogy együttműködésével megkönnyítette és segítette munkánkat, melyet az Ön gyógyulása érdekében végzünk!